

Formation au défibrillateur externe automatique (DEA)

Jeudi 6 février 2020


BC Erpent

Dr Paul Massion



Au secours!!!! Que faire???





Réanimation de Base avec l'utilisation d'un Défibrillateur Externe Automatique (DEA)





**Dès que le DEA est disponible:
brancher le DEA et appliquer
les électrodes**

Quand un choc est indiqué

Suivre les instructions du DEA

**Continuer la RCP jusqu'à ce que vous êtes certain que la victime a récupéré et
recommence à respirer normalement**

- Si formé et compétent à combiner les compressions thoraciques avec les insufflations, sinon continuer uniquement les compressions thoraciques
 - Placer les lèvres autour de la bouche en veillant à assurer une bonne étanchéité.
 - Insuffler de façon régulière en regardant le thorax monter
 - Insuffler une seconde fois lorsque le thorax est redescendu
- Continuer la RCP: 30 compressions thoraciques et 2 insufflations

- Suivre les instructions verbales/visuelles
- Appliquer une électrode en-dessous de l'aisselle gauche
- Appliquer l'autre électrode sous la clavicule droite et à côté du sternum
- Si plus d'un secouriste présent: ne pas interrompre la RCP

- Prendre distance et administrer le choc
- Continuer la RCP

En résumé: « 112-Masser-choquer »

- Monsieur??
Respire?
 - secouer, à l'aide! ☹️
 - 112, vite le DEA!
 - Masser (si à 2)
- DEA posé?
 - choquer si recommandé
 - masser 2min
- DEA 2è analyse?
 - choquer si recommandé
 - remasser 2 min...
- Pin-pon...?
 - continuer jusqu'à arrivée secours 😊

Conscient???



Respire???

Figure 5.3
Head tilt et chin lift



Figure 5.4
Rechercher respiration ou tout autre mouvement



1^{ère} chose à faire = Appeler le 112



et vite le DEA !





2è chose à faire: masser !

Position des mains pour les compressions thoraciques







Boyz n the Hood - Boys On Down (Dip Off)



3^è chose à faire: allumer le DEA et lui obéir:
choquer si recommandé !!!!



Activer le DEA

**Suivre les instructions:
Écouter le DEA, il dit
tout!**

Certains DEA s'activent
automatiquement à
l'ouverture du couvercle



Appliquer les électrodes (par le témoin; le premier continue à masser)



Ecartez-vous pendant l'analyse

- Restez à distance
- Ne touchez pas la victime



Si le choc est indiqué

- Restez à distance
- Délivrez le choc en sécurité



Boum!!! Choc délivré

Reprendre immédiatement la RCP (30:2)

Suivre les instructions vocales/visuelles



Choc non indiqué

Reprendre immédiatement la RCP

Suivre les instructions vocales/visuelles



Continuer à masser jusqu'à ce que les secours arrivent

sauf si réveil évident, bouge, ouvre yeux, respire normalement... = minorité (30% après 2-5min)


Si la personne est
inconsciente et respire
normalement

Placez la victime en **Position Latérale de Sécurité**



Position Latérale de Sécurité






- Agenouillez-vous à ses côtés et, dans la mesure du possible, dénudez sa poitrine.
- Placez le bras de la victime le plus proche de vous, à angle droit de son corps. Pliez ensuite son coude tout en gardant la paume de sa main tournée vers le haut.
- Placez-vous à genoux à côté de la victime.
- Saisissez d'une main le bras opposé de la victime et placez le dos de sa main contre son oreille côté sauveteur.
- Maintenez la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre paume.




- Avec l'autre main, attrapez la jambe opposée, juste derrière le genou et relevez-la tout en gardant le pied au sol.
- Placez-vous assez loin de la victime au niveau du thorax pour pouvoir la tourner sans avoir à vous reculer.



- Tirez sur la jambe pliée afin de faire rouler la victime vers vous jusqu'à ce que le genou touche le sol. **Le mouvement de retournement doit être fait sans brusquerie, en un seul temps. Le maintien de la main de la victime contre sa joue permet de respecter l'axe de la colonne vertébrale cervicale.**
- Si les épaules de la victime ne tournent pas complètement, coincez le genou de la victime avec votre propre genou, pour éviter que le corps de la victime ne retombe en arrière sur le sol, puis saisissez l'épaule de la victime avec la main qui tenait le genou pour achever la rotation.



- Dégagez votre main qui est sous la tête de la victime, en maintenant le coude de celle-ci avec la main qui tenait le genou (pour ne pas entraîner la main de la victime et éviter toute mobilisation de sa tête).



- Fléchissez la jambe du dessus pour que la hanche et le genou soient à angle droit (de façon à stabiliser le corps de la victime).
- Ouvrez la bouche de la victime avec le pouce et l'index d'une main, sans mobiliser la tête, afin de permettre l'écoulement des liquides vers l'extérieur.

<http://sauveunevie.be/e1/>

A Pre-Hospital Extracorporeal Co x Hypothermia outcome predictio x Le coeur de Cathy | Sauve une vie x +

Non sécurisé | sauveunevie.be/e1/

Applications Ecosia - Le moteur... Google Home - PubMed -... Passerelle VPN de l'... http://192.168.128... Omnipro Portail Ap... ULiège Library catal... libnet Ulg Autres favoris



MENTIONS LÉGALES CRÉDITS SE FORMER MAKING OF PARTAGEZ

FR

Taper ici pour rechercher

16:50 21-01-20





**British Heart
Foundation**

Registered charity in England & Wales (225971) and Scotland (SC039426)

Lifesaving, Pure and Simple



HeartSine®
Inventor. Innovator. Lifesaver.



Application Reanim (ligue cardiologique belge)

- Carte maps avec tous les DEA à proximité



En résumé: « 112-Masser-choquer »

- Monsieur??
Respire?
 - secouer, à l'aide! ☹️
 - 112, vite le DEA!
 - Masser (si à 2)
- DEA posé?
 - choquer si recommandé
 - masser 2min
- DEA 2è analyse?
 - choquer si recommandé
 - remasser 2 min...
- Pin-pon...?
 - continuer jusqu'à arrivée secours 😊

112 – Masser --choquer

112 – Masser - choquer



112 – Masser - Choquer

112 – Masser - Choquer





merci !!!